

XVI. *Description of a new genus of Clerideous Coleoptera, from the Malayan Archipelago.* By J. O. WESTWOOD, M.A., F.L.S., &c.

[Read 7th June, 1875.]

ALLOCHOTES.

Genus novum e familiâ *Cleridarum*, forma omnino insolita, semiglobosa, coccinelliforme, glaberrimum, setosum. Caput pronum, supra vix visibile, margine antico emarginato. Oculi magni, antice late emarginati. Labrum parvum, transversum, vix porrectum, antice setosum. Mandibulæ validæ, elongato-trigonæ, apice forte bidentatæ, in lobo elongato membranaceo setoso ante medium instructæ. Maxillæ parvæ, lobis duobus elongatis simplicibus apice setoso, basi transverso corneo; palpi maxillares articulo ultimo elongato-securiformi. Mentum parvum, transversum, ligulâ elongatâ parallelâ; labium profunde emarginatum, setosum. Palpi labiales articulo ultimo elongato-securiformi. Antennæ vix thoracis longitudine, 11-articulatæ, articulo 1mo oblongo, 2ndo minuto, 3tio longiori gracili, 4to ad 10um sensim paullo latioribus, 11mo majori ovali. Pronotum semicirculare, lateribus rotundatis. Prosternum brevissimum in medio inter coxas anticas haud prominens. Mesosternum brevissimum, simplex, inter coxas medias triangulum minutum antice efficiens. Metasternum transversum, simplex. Abdomen subconicum, e segmentis sex formatum. Pedes simplices, parum elongati; tarsis omnibus 4-articulatis, articulis tribus basalibus subtus in lobum membranaceum bifidum productis. Elytra fere hemispherica, glaberrima, setigera.

Pl. IX. fig. 1*a*, head and antenna; 1*b*, mandible; 1*c*, maxilla; 1*d*, mentum, labium and labial palpi; 1*e*, prothorax seen from below; 1*f*, meso- and meta-sterna and abdomen; 1*g*, tarsus sideways; 1*h*, tarsus from above.

Obs.—E *Chorecine advena* Pascoe, Journ. of Entomol. i. 49, pl. 2, fig. 2, differt antennis apice incrassatis, thoracis formâ latiori, clytris que glaberrimis.

Species 1. *Allochotes bicolor*. (Pl. IX. fig. 1.)

Aurantiaco-fulvus, pronoto fulvo-setoso, clytris nigro-  
viridibus punctatis, nigro-setosis; corpore infra cum pedibus et antennis fulvis.

Long. corp. lin. 3; lat. elytr. lin.  $2\frac{3}{4}$ .

Habitat Makassar (Wallace). In Mus. Hopeiano Oxoniae.

Varietas? (*Allochotes Mortica*) e præcedenti differt magnitudine paullo minori elytrisq̄ æneo-viridibus, luteo-setosis.

Habitat in insulâ Morty (Wallace). In Mus. Hopeiano Oxoniae.

Species 2. *Allochotes apicalis*.

Fulva, elytris nigro-æneis punctatis, nigro-setosis, triente apicali fulvo, luteo-setoso.

Long. corp. lin.  $3\frac{1}{4}$ .

Habitat in Nova Guinea (Wallace). In Mus. Hopeiano Oxoniae.

Species 3. *Allochotes Chrysomelina*.

Fulva, elytris chalybæis, griseo-setosis, crebre punctatis.

Long. corp. lin.  $2\frac{1}{2}$ .

Habitat in insulâ Dorei (Wallace). In Mus. Hopeiano Oxoniae.

Species 4. *Allochotes Eubrioides*.

Supra nigra, nitida, vix punctata, elytrorum lateribus dense griseo-setosis; corpore infra cum pedibus et antennis lutescenti; tibiis infuscatis; elytris paullo minus rotundatis.

Long. corp. lin.  $2\frac{3}{4}$ .

Habitat Sumatra (Wallace). In Mus. Hopeiano Oxoniae.

Species 5. *Allochotes Coccinella*.

Tota fulvo-ochracea, glabra, punctata, fulvo-setosa.

Long. corp. lin. 3.

Habitat Ceram (Wallace). In Mus. Hopeiano Oxoniae.

Species 6. *Allochotes fulvescens*.

Tota fulva, punctata, fulvo-setosa, elytrorum humeris haud antice porrectis, rotundatis.

Long. corp. lin.  $2\frac{1}{2}$ .

Habitat insula Batchian (Wallace). In Mus. Hopeiano Oxoniae.

Species 7. *Allochotes Scynnoides*.

Minuta, fulva; elytris æneis, glaberrimis, punctatis, nigro-setosis.

Long. corp. lin.  $1\frac{3}{4}$ .

Habitat Singapore (Wallace). In Mus. Hopeiano Oxoniae.